

Cuales son las ventajas de la prueba rápida de VIH en saliva?

La prueba rápida de VIH en saliva tiene muchas ventajas con respecto a las pruebas convencionales. Algunas de ellas son:

- La prueba de VIH en saliva es menos costosa para las agencias que tiene presupuestos limitados
- Los resultados se entregan aproximadamente en 20 minutos, y aquellos con resultado positivos son incluidos rápidamente en programas de atención medica
- La prueba en saliva es mas fácil de usar

Cuando usted está esperando el resultado de la prueba de confirmación, es importante mantener prácticas sexuales seguras para prevenir la propagación del VIH a otras personas.

En todo momento, la confidencialidad es mantenida para todos los pacientes, independientemente del estado serológico. El paciente otorga el debido consentimiento antes de que cualquier información confidencial médica o dental sea entregada a su servicio de atención médica o dental.

La identificación temprana de la infección por VIH ayuda a un diagnóstico efectivo y a la prescripción de profilaxis y tratamiento de las infecciones oportunistas. También determina la necesidad de comenzar a recibir tratamiento con medicamentos llamados antirretrovirales (ARV).

Además, la detección temprana puede ayudar a prevenir la transmisión del VIH a otras personas

Para mas información visite:

Pennsylvania /MidAtlantic AETC
AETC National Resource Center
Center for Disease Control and Prevention

www.pamaaetc.org
www.aids-ed.org
www.cdc.gov


Pregúntale a tu Odontólogo. Toma una decisión correcta, Hazte la prueba del VIH.

Autores

Linda Frank, PhD, MSN, ACRN, CNS, FAAN
Principal Investigador y Directora Ejecutiva
Pennsylvania/MidAtlantic AIDS Centro de Educación y Aprendizaje

Louis G. De Paola, DDS, MS
Director Dental
Pennsylvania/MidAtlantic AIDS Centro de Educación y Enseñanza sobre el VIH

Elsmarie Hormechea DMD, MHA, MPH
Departamento de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Facultad de Salud Publica
Universidad de Pittsburgh



MANIFESTACIONES ORALES DEL VIH/SIDA



Guía para pacientes
de consulta
odontológica



Manténgase informado!

Para mas información sobre oportunidades en educación y aprendizaje en VIH/SIDA visita

www.pamaaetc.org

Pennsylvania/MidAtlantic AIDS Centro de Educación y Aprendizaje

130 DeSoto Street, A427 Crabtree Hall

Pittsburgh, PA 15261

Telefono:412-624-1895

© 2013 Todos los derechos reservados.

Usted qué necesita saber sobre el VIH?

Qué es el VIH?

VIH significa Virus de Inmunodeficiencia Humana. Este virus de inmunodeficiencia humana causa el SIDA. Como resultado, las personas con SIDA desarrollan serias condiciones como cáncer e infecciones llamadas oportunistas, las cuales solo causan enfermedades cuando el sistema inmunológico está debilitado.

¿Cómo se infectan las personas?

- El VIH puede transmitirse a través de cualquier tipo de relaciones sexuales sin protección: oral, vaginal o anal si una de las personas tiene el virus; tener múltiples parejas sexuales o la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) que puede aumentar el riesgo de infección durante las relaciones sexuales.
- Compartir agujas, jeringas o cualquier instrumento usado para preparar drogas ilícitas inyectables.
- Las mujeres infectadas pueden transmitir el virus a sus bebés durante el embarazo, el parto, e incluso en la lactancia.
- A través de transfusiones sanguíneas también es posible infectarse con el VIH, aunque las pruebas a donantes de sangre en los Estados Unidos ha reducido significativamente el riesgo de transmisión por transfusión.

El VIH **NO** se transmite mediante el contacto con el sudor, lágrimas, saliva, abrazos o un beso casual con una persona infectada. Las personas **NO** se infectan con el VIH a través del contacto casual con personas en el trabajo, la escuela, el hogar o en cualquier otro lugar. El VIH **NO** se transmite por picaduras de insectos.

El VIH no hace que te enfermes, quien lo hace son las infecciones oportunistas. Como el VIH debilita el sistema inmunológico, se convierte en un riesgo para las infecciones que pueden hacer que Usted se sienta mal si no se tratan a tiempo.

Que es el SIDA?

SIDA significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Adquirida significa que la enfermedad no es genética, pero se desarrolla a partir del contacto con un agente causante de la enfermedad en este caso, el VIH. Inmunodeficiencia significa que la enfermedad se caracteriza por un debilitamiento del sistema inmune y el síndrome se refiere a un grupo de síntomas que caracterizan una enfermedad.

¿Por que el VIH esta relacionado con la salud oral?

La mayoría de signos y síntomas de la infección por VIH aparecen por primera vez en la boca. Las infecciones bacterianas, por hongos y virales son sólo algunos de los problemas que enfrentan los pacientes VIH positivo. La gran mayoría de los problemas dentales en los pacientes con VIH son fácil de reconocer pero no son tratadas a tiempo.

Por favor, llame a su dentista y programe una cita si nota alguno de estos síntomas:

- Encías rojas e inflamadas con sangrado espontáneo y pérdida de tejido que rodea los dientes
- Lesiones de color rojo, marrón, rosa o púrpura en la piel, dentro de la boca (mucosa oral o el techo de la boca) y puede sugerir Sarcoma de Kaposi
- Presencia de manchas blancas en la lengua, la garganta, en el interior de la boca o las encías, esto puede ser síntomas de candidiasis o leucoplasia vellosa oral
- Llagas o úlceras aftosas, dolor de oído o dificultad para tragar
- Verrugas, protuberancias o sensación de obstrucción de la garganta



Identificar de forma temprana este tipo de problemas orales permite un tratamiento rápido antes de que las infecciones avancen a condiciones más graves.

¿Eres VIH negativo?

¿Por qué debería hacerme la prueba?

La prueba del VIH es la clave para frenar la epidemia. Conocer el estado serológico podría ser una de las cosas más importantes que debes hacer. El CDC recomienda que los pacientes consideren hacerse la prueba al menos una vez al año para quienes incurran en conductas que pueden transmitir la infección por VIH.

¿Cuáles son sus opciones para la prueba del VIH?



Tradicionalmente la prueba del VIH consiste en una extracción de sangre y mínimo un período de 72 horas antes que una persona puede conocer los resultados. Con **OraQuick Advance**®HIV 1/2 la prueba de anticuerpos para el uso con fluido oral, los resultados preliminares de VIH ahora se puede obtener en 20 minutos.

Esta es la única prueba en fluido oral para el VIH aprobada en los Estados Unidos por la FDA. Un resultado positivo de la prueba del VIH en fluido oral es un positivo preliminar y debe ser confirmado por una prueba adicional, más específica, para comprobar si los anticuerpos contra el VIH están presentes (test de Elisa o Western Blot).

Si ha recibido un resultado preliminar positivo en la prueba de fluido oral, y si es confirmado positivo el resultado por medio de la prueba específica, Usted y su proveedor de atención médica pueden planificar el tratamiento temprano, y mejorar sus posibilidades de demorar la progresión del VIH.

Si usted tiene preguntas sobre la prueba del VIH o si desea información sobre dónde puede recibir una prueba rápida de VIH, por favor hable con su dentista, su médico familiar, o comuníquese con el departamento de salud más cercano.

Independientemente del resultado, hacerse la prueba aumenta su compromiso con los buenos hábitos de salud.

- * Si resulta positivo, puede aprender más acerca del VIH y tomar las riendas del cuidado de su salud.
- * Si está pensando en tener un bebé, puede aprovechar los tratamientos que podrían prevenir la transmisión del VIH al bebé.